RIVERM у плодових садах

Виробничий звіт та фотоматеріали

Умови та схема застосування

Виробниче випробування проводили у плодорозсаднику ПП «Антарсад» та ФГ «Екоягода» на абрикосі, персику і сливі. Абрикос у фазі рожевого бутона обробили 2% розчином RIVERM - 8 л на 400 л води. Персик у фазі рожевого бутона обробили такою самою концентрацією. Сливу обробили у фазі зелено-білого бутона. Надалі всі експериментальні ділянки повторно обробили RIVERM у нормі 3 л/га (1% робочий розчин).

Під час сильного весняного заморозку температура знизилася до -7 °C у ФГ «Екоягода» та до -8,7 °C у ПП «Антарсад». У звіті окремо описані результати на ділянках, де дерева були оброблені RIVERM.

Зафіксовані результати

- Усі дерева, оброблені RIVERM, за описом виробничого звіту витримали сильний заморозок.
- На абрикосі врожайність знизилася на 30-40%, тоді як у сусідніх садах і на ділянках без RIVERM урожай був відсутній.
- На персику при температурі до -7 °C урожайність знизилася максимум на 10%.
- У ПП «Антарсад» при температурі до -8,7 °C збереглося не менше 40% урожайності.
- Слива у фазі зелено-білого бутона дала 100% урожайність в обох господарствах.

Статус матеріалу

Це виробничий звіт, а не рандомізований науковий дослід. Наведені цифри описують конкретні умови господарств і не є гарантією однакового результату в усіх садах. Фотоматеріали нижче взято з архівного звіту. У підписах окремо зазначено, де застосовувався тільки RIVERM, де RIVERM разом із Валміцином, а де препарати не застосовувалися.

Фотоматеріали: RIVERM без Валміцину



Фото 5. Цвітіння абрикоса сорту «Цунамі», обробленого 2% розчином RIVERM без застосування Валміцину. Це один із найцінніших фотоматеріалів, де дія RIVERM не змішана з іншим препаратом.

Порівняння розвитку кореневої системи



Фото 16. Коренева система саджанців персика: у вихідному звіті вказано порівняння саджанців, оброблених RIVERM, із необробленими.

Додаткові фотоматеріали з виробничого звіту





Фото 10-11. Стан листя і плодів у середині літа. У вихідному звіті для цих ділянок прямо зазначено спільне застосування RIVERM + Валміцин. Тому ці фото подаються лише як додатковий виробничий матеріал і не використовуються для приписування результату виключно RIVERM.



Фото 12. Стан персика в середині літа на ділянці, де, за підписом у вихідному звіті, не застосовували ні RIVERM, ні Валміцин.

Примітка: підписи до фотоматеріалів перекладено та відредаговано українською мовою без зміни змісту вихідного звіту.